

FEMPROPOREX HCl

Inibidor de Apetite, Anorexígeno

Indicações

Obesidade (tratamento adjunto). Após administração oral, transforma-se em anfetamina.

Dose

Adultos: Máximo de 50 mg/ dia. Recomenda-se até 25mg, 2x ao dia (manhã e tarde).

Reações adversas

Boca seca; constipação; depressão reacional; diarreia; distúrbio do humor; dor de cabeça; fraqueza; insônia; náusea; nervosismo; sonolência; tontura.

Precauções

Não usar o produto em: alcoólatras, arteriosclerose avançada, crianças menores de 12 anos, doença cardiovascular, glaucoma, hipersensibilidade aos simpaticomiméticos, história de abuso de drogas, pacientes que irão se submeter a anestesia geral (pode ser fatal), pressão arterial muito alta.

Amamentação: NÃO AMAMENTAR.

RISCO / BENEFÍCIO: diabetes mellitus, epilepsia, hipertensão leve, história de depressão, idosos.

Interações

- Pode aumentar os efeitos pressores dos vasoconstritores (epinefrina, norepinefrina, levonordefrina) utilizados em anestesia dental;
- Pode aumentar os riscos de efeitos no SNC com : álcool;
- Pode aumentar os riscos de arritmias cardíacas com: anestésicos de inalação hidrocarbonados;
- Pode exigir ajustes de dose de: antidiabéticos orais, insulina;
- Pode diminuir os efeitos de: anti-hipertensivos;
- Pode ter efeitos aditivos depressores do SNC com: medicamentos que produzem depressão do SNC;
- Pode ter efeitos aditivos estimulantes do SNC com: medicamentos que produzem estimulação do SNC; hormônios tireoideanos;
- Pode desencadear crises hipertensivas com: IMAO, incluindo furazolidona, procarbazina e selegilina. Não usar. Esperar pelo menos 14 dias de intervalo entre a interrupção do supressor do apetite e o uso de IMAO.

Considerações

- Não ingerir bebida alcoólica;
- Adotar dieta rica em fibras;
- Tomar grande quantidade de líquidos;
- O produto pode criar hábito e causa dependência psicológica. Não tomar por mais de 12 semanas;

- Se o paciente tiver que se submeter a alguma cirurgia (com anestesia geral) e esta não puder ser adiada, o produto deve ser descontinuado no mínimo 1 semana antes do procedimento cirúrgico;
- Pacientes diabéticos podem ter suas necessidades de insulina e sulfoniluréia alteradas com o uso desse produto.
- Se o paciente tiver tolerância pelo produto, não aumentar as doses do mesmo e sim descontinuí-lo (gradativamente);
- Não tomar o produto à tarde, ou à noite, para evitar insônia.