

BISACODIL

Bisacodil é um laxante cujo mecanismo de ação é aumentar o peristaltismo mediante efeito direto sobre a musculatura lisa intestinal por estimulação dos plexos nervosos intramurais. Foi demonstrado que O bisacodil facilita a acumulação de líquidos e íons do cólon para aumentar o efeito laxante. Sua ação manifesta entre 6 e 12 horas após administração oral. É minimamente absorvido por via oral ou retal, produzindo a formação de fezes aquosas.

Sinônimos: Bisacodilo, Bisacodylum, Bisakodyl.

C.A.S.: 603 – 50 – 9

PM: 361,4

INDICAÇÕES: Bisacodil é indicado para favorecer a defecação em pacientes geriátricos com resposta motora de cólon diminuída ou para esvaziar o cólon na preparação de exames do reto ou do intestino e em cirurgia programada de cólon.

DOSES E USOS: Bisacodil é um laxante adequado para uma terapêutica a longo prazo, se for necessário. Deve ser administrado ao deitar para que produza os efeitos pela manhã: 1 supositório ou 1 a 2 drágeas (ou cápsulas com revestimento entérico), a faixa usual é de 5 a 10mg/dia.

REAÇÕES ADVERSAS: Reações adversas ocasionais: Confusão, arritmias cardíacas, câibras musculares, cansaço ou debilidade não habituais (a superdose aguda ou o uso crônico indevido podem ocasionar desequilíbrios eletrolíticos), erupção cutânea.

PRECAUÇÕES:

- Deve-se beber diariamente, pelo menos, 6 a 8 copos (240ml cada) de líquido para ajudar a amolecer as fezes.
- Não mastigar nem triturar os comprimidos e não tomar com leite ou antiácidos.
- Não tomar por mais de 1 semana.

CONTRA INDICAÇÕES: Bisacodil é contra indicado em pacientes com sintomas de apendicite. O uso indevido ou prolongado pode produzir dependência na função intestinal.

REFERÊNCIAS

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35. Ed. PhP: Londres, 2007.

GOODMAN AND GILMAN. **As Bases Farmacológicas da Terapêutica**. 9ed. McGrawHill Interamericana. Rio de Janeiro,1996.

RANG, H.P.,DALE, M.M.,RITTER J.M. **Pharmacology**. 3ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 1997.

P.R.Vade-mécum. Acesso em: 11/03/2008.
Disponível em: <http://www.prvademecum.com>

BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO,Y. **Formulário Médico Farmacêutico**. 3.ed. São Paulo: Pharmabooks. 2006.