

# BROMETO DE PINAVÉRIO SII

## APRESENTAÇÃO

A Síndrome do Intestino Irritável (SII), também chamada colite espasmódica e cólon irritável, afeta entre 15% e 20% da população ocidental. No Brasil estima-se que a doença se manifeste em aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, sendo as mulheres acometidas em maior proporção (59%) que os homens (41%). Classificada como doença funcional, pois não apresenta alterações orgânicas no aparelho digestivo identificadas em exames laboratoriais e sim no funcionamento do intestino, a SII tem características psicossomáticas e está intimamente relacionada às emoções, depressão, ansiedade, alterações do sono etc. Os sintomas mais comuns são dor e desconforto abdominal, diarreia e/ou prisão de ventre.

Segundo relatos médicos, cerca de 50% dos pacientes que procuram atendimento gastroenterológico sofrem de problemas funcionais, sendo a SII a doença mais frequentemente diagnosticada.

## O QUE É BROMETO DE PINAVÉRIO SII?

Brometo de Pinavério SII é uma substância, uma droga, um remédio, um agente químico comprovadamente eficaz e seguro no tratamento de pacientes com SII, pois alivia as cólicas e regula o funcionamento intestinal, normalizando a frequência das evacuações. É um agente espas-molítico que age exclusivamente no tubo digestivo.

## PROPRIEDADES

O agente farmacológico é antiespasmódico, não atropínico com propriedades antiálgicas sobre a musculatura lisa do intestino.

## MECANISMO DE AÇÃO

O produto atua exclusivamente no tubo digestivo e é um antagonista do cálcio, atuando sobre as células da musculatura lisa intestinal.

A absorção de Brometo de Pinavério SII no trato gastrointestinal é inferior a 10%, o que faz com que sua ação seja local, no trato intestinal. É rapidamente metabolizado pelo fígado e eliminado, predominantemente, pela bile. Por isso, Brometo de Pinavério SII é desprovido de efeitos anticolinérgicos, inclusive os cardiovasculares.

## BENEFÍCIOS DO BROMETO DE PINAVÉRIO SII

A substância reduz a duração da dor e da distensão abdominal, alivia sintomas reto-anal e conseqüentemente promove a melhoria da qualidade de vida do paciente. Esses benefícios foram observados em estudo realizado com 40 pessoas durante três semanas com administração de comprimidos de 50 mg de Brometo de Pinavério SII e um placebo com as mesmas características de aparência e odor.

## INDICAÇÃO DE APLICAÇÕES

Tratamento da Síndrome do Intestino Irritável e ou colite espasmódica.

## POSOLOGIA

O paciente deve ingerir 50 mg de Brometo de Pinavério SII de 3 a 4 vezes ao dia.

## CONTRA-INDICAÇÕES

Não é recomendado para crianças, gestantes e durante a lactação. Pacientes com hipersensibilidade à substância devem evitá-la.

## REAÇÕES ADVERSAS

Raramente ocorrem erupção cutânea e alterações digestivas leves. Podemos incluir como reação adversa a disfagia gástrica, se ingerido antes das refeições.

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Estudos não descrevem interações medicamentosas com outro tratamento concomitante, como hipoglicemiantes orais, anticoagulantes e digitálicos.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Pó cristalino branco, Brometo de Pinavério SII é solúvel em metanol.

## AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA

Nada foi encontrado.

## ARMAZENAMENTO

Manter hermeticamente fechado à temperatura ambiente em local fresco e ao abrigo da luz.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dicetel®, Brometo de Pinavério, DI 00S075-03-A versão 19-07-02 – Altana Pharma Ltda.


Jaiwal J; Imperiale T; Kroenke K. Pharmacologic Treatment of the Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review of Randomized, Controlled Trials. Ann Inter Med 2000; 133; 136-147.

Klein K. Controlled treatment trials in the Irritable Bowel Syndrome: a critique Gastroenterology 1988; 95; 232-241.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349

 vendas@farmacam.com.br

 whatsapp (21) 98493-7033

 Facebook.com.br/farmacam

 Instagram.com.br/farmacam