

DESONIDA

Ações terapêuticas

Corticosteróide tópico.

Propriedades

É um corticóide de uso tópico que desenvolve ações antiinflamatórias, antipruriginosas e vasoconstritoras. A absorção percutânea da desonida aumenta com a falta de integridade da barreira epitelial e é influenciada pelo tipo de veículo e pelo uso de vendas oclusivas. Sua ação depende da difusão do fármaco através das membranas celulares até o citosol, onde forma complexos com receptores citoplasmáticos específicos; esses complexos penetram no núcleo da célula, ligam-se ao DNA (cromatina) e estimulam a transcrição do mRNA e a posterior síntese de várias enzimas que são responsáveis pelos efeitos dos corticosteróides sistêmicos. Mesmo assim, esses agentes podem suprimir a transcrição do mRNA em algumas células (por exemplo, linfócitos). Diminui ou previne as respostas do tecido aos processos inflamatórios, reduzindo os sintomas da inflamação sem tratar a causa subjacente; inibe o acúmulo de células inflamatórias, inclusive macrófagos e leucócitos nas regiões de inflamação. Também inibe a fagocitose, a liberação de enzimas lisossômicas e a síntese e liberação de diversos mediadores químicos da inflamação. Os mecanismos da ação imunossupressora não são completamente conhecidos, mas podem incluir a supressão ou prevenção das reações imunes mediadas por células (hipersensibilidade retardada) assim como ações mais específicas que afetem a resposta imune. A maior parte do fármaco é metabolizada principalmente no fígado a metabólitos inativos; tanto o fármaco como os metabólitos são excretados pela urina.

Indicações

Dermatite, dermatose, eczemas, dermatite de contato, pruridos, psoríase, lúpus eritematoso discóide, otites externas alérgicas.

Superdosagem

Supressão reversível do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.

Modo de usar

Aplicar localmente uma fina camada na região afetada, repetir duas ou três vezes por dia (apresentação em creme, loção, gel ou pomada geralmente a 0,05%) em adultos. Uma venda oclusiva (película plástica) pode ser utilizada para manejar psoríase e outras patologias recalcitrantes; se uma infecção se desenvolver, deve-se suspender o uso de vendas oclusivas e deve ser aplicada uma terapia antimicrobiana adequada.

Reações adversas

Podem ocorrer reações locais, sensações de calor, coceira, irritação, secura, foliculite, hipertricose, erupções acneiformes, hipopigmentação, dermatite perioral, dermatite alérgica de contato, maceração da pele, infecção secundária, atrofia da pele e estrias.

Precauções

A absorção sistêmica dos corticóides tópicos pode causar supressão reversível do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, manifestações da síndrome de Cushing, hiperglicemia e glicosúria em alguns pacientes. A aplicação prolongada, em regiões amplas, e as vendas oclusivas favorecem o incremento da absorção sistêmica. Recomenda-se não aplicar em criança de menos de dois anos. O tratamento crônico em crianças pode interferir no crescimento e desenvolvimento. O uso durante a gravidez deve ser restringido a um curto prazo e a pequenas áreas da pele.

Contra-indicações

Hipersensibilidade à desonida.

Referência Bibliográfica

P.R. Vade-mécum 2004/2005