

DIPIRONA SÓDICA

A Dipirona sódica é um analgésico e antipirético, com propriedade antiespasmódica e componente antiinflamatório. Age ao nível central e periférico, simultaneamente. A absorção gastrointestinal é rápida, uniforme e quase completa; Duração do efeito de 4 a 6 horas, a biotransformação é hepática e excreção é renal.

Sinônimos: Metanossulfonato sódico; Metamizol sódico.

C.A.S: 5907-38-0

PM: 351,40

INDICAÇÕES E AÇÕES FARMACOLÓGICAS: Alergias por afecções reumáticas, cefaléias ou odontalgias. Dores posteriores a intervenções cirúrgicas, espasmos do aparelho gastrointestinal, condutos biliares, rins e vias urinárias. Febre, no caso de outra medicação antifebril não ser eficaz.

Sua meia-vida no organismo é de 7 horas e excreta-se por via urinária como 4-metilaminoantipirina, 4-aminoantipirina e 4-acetilaminoantipirina. Atua também como inibidor seletivo das prostaglandinas F_{2a}.

DOSES E USOS: Por via oral, 300 a 600mg/dia; a dose máxima diária é de 4g. Ampolas: 0,5 a 1g por via SC, IM ou IV.

REAÇÕES ADVERSAS: Reações mais frequentes: hipotermia e reações de hipersensibilidade que afetam a pele (urticária), a conjuntiva e a mucosa nasofaríngea.

PRECAUÇÕES: Com a administração desta droga, os pacientes que padecem de asma brônquica ou infecções crônicas das vias respiratórias e os afetados por reações de hipersensibilidade, inclusive a substâncias não-medicamentosas, estão expostos ao risco de choque. Durante o primeiro trimestre da gravidez e em suas últimas semanas, assim como em lactentes, crianças pequenas e pacientes com distúrbios hematopoiéticos somente deverá ser administrada com prescrição médica. Na forma injetável é imprescindível ter cuidado com pacientes cuja pressão arterial for inferior a 100mmHg, os que se encontram em situação de instabilidade circulatória ou que sofram alterações prévias do sistema hematopoiético (por exemplo, tratamento com citostáticos).

INTERAÇÕES : Pode ocorrer uma diminuição no nível de ciclosporina. A administração simultânea com clorpromazina pode provocar hipotermia grave.

Alcântara Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / ZéGaroto Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam

CONTRA-INDICAÇÃO: É contra-indicada em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos derivados pirazolônicos ou com determinadas doenças metabólicas, tais como porfíria hepática e deficiência congênita de glicose-6-fosfato-desidrogenase.

REFERÊNCIAS

P.R.Vade-mécum. Disponível em: <http://www.prvademecum.com>

Alcântara Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / ZéGaroto Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam