

FAMOTIDINA

Ações terapêuticas

Antiulceroso. Antagonista dos receptores H 2 da histamina. Inibidor da secreção gástrica ácida.

Propriedades

Antagonista dos receptores H 2 derivado do tiazol, bloqueia a secreção gástrica ácida basal e noturna pela inibição competitiva da ação da histamina sobre os receptores H 2 das células parietais; também bloqueia a secreção gástrica ácida estimulada pelos alimentos e a pentagastrina. É absorvida por via oral de forma incompleta (biodisponibilidade de 40 a 45%). Sua união às proteínas é baixa (15 a 20%). É metabolizada no fígado com um metabolismo de primeiro passo mínimo. O início da ação fica evidente uma hora após a administração oral. A duração de sua ação se mantém por 10 a 12 horas e é eliminada por via renal e metabólica.

Indicações

Tratamento a curto prazo da úlcera duodenal ativa, estados hipersecretórios gástricos, Síndrome de Zollinger-Ellison.

Posologia

Adultos: úlcera péptica, 40mg 1 vez ao dia, ao deitar, ou 20mg 2 vezes ao dia. Profilaxia da úlcera duodenal recorrente: 20mg ao deitar. Síndrome de Zollinger-Ellison, estados hipersecretórios gástricos: 20mg a cada 6 horas, e ajustar a dose segundo a necessidade; continuar o tratamento durante o tempo clinicamente indicado. Em pacientes com disfunção renal grave: 20mg ao deitar.

Reações adversas

São de rara incidência: taquicardia, palpitações, febre, hemorragias ou hematomas injustificados e cansaço ou debilidade não habituais. Podem ser observados de forma menos freqüente: ansiedade, constipação, sonolência, secura da boca, artralguas, mialgias, náuseas ou vômitos, erupção cutânea ou prurido, perda temporal de cabelo e anorexia.

Precauções

Evitar a ingestão de alimentos, bebidas ou outros fármacos que possam produzir irritação gastrointestinal. É possível que os pacientes que não toleram a ranitidina ou a cimetidina também não tolerem esta medicação.

Interações

A administração simultânea de cetoconazol com famotidina pode provocar uma redução na absorção do cetoconazol, dado que a famotidina aumenta o pH gastrointestinal.

Contra-indicações

A relação risco-benefício deverá ser avaliada em presença de disfunção hepática ou renal grave.


Referência Bibliográfica

P.R. Vade-mécum 2004/2005

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349

 vendas@farmacam.com.br

 whatsapp (21) 98493-7033

 Facebook.com.br/farmacam

 Instagram.com.br/farmacam