

EXTRATO GLICÓLICO DE JABORANDI

Adstringente, anti-séptico, antioleosidade e estimulante capilar

Extrato Glicólico

É obtido por processo de maceração ou percolação de uma erva em um solvente hidro-glicólico, podendo ser este o propilenoglicol ou a glicerina. Este extrato normalmente é utilizado nos fitocosméticos. A relação erva/solvente varia, sendo que normalmente se utiliza a relação indicada para as tinturas vegetais.

O extrato glicólico é indicado para aplicação em soluções aquosas, géis de álcool, emulsões água/óleo e tensoativos (sabões, banhos de espuma, xampus).

JABORANDI

NOME BOTÂNICO: Pilocarpus jborandi H, P. Microphyllus Stapf, P. Pennatifolius L.

FAMÍLIA: Rutaceae

PARTE UTILIZADA: Folha

INDICAÇÕES

- Fitoterápico:

Oftalmologia: glaucoma.

Afecções reumáticas: artrites, febres, cólicas intestinais e hepáticas, blenorragias, amenorréia e edema pulmonar.

- Fitocosmético: tratamento da queda dos cabelos.

DOSE

- Fitoterápico:

* Uso Interno

Pó: 2-5 g diárias em doses máximas de 0,5g

Tintura: 2-5ml/dia

Infuso: 20g do pó das folhas em 1 litro de água. Beber 2 xícaras ao dia entre as refeições.

* Uso Externo

Colírios: 1 a 2%

- Fitocosmético:

Loções capilares e xampus anti-queda: 2-5% de extrato glicólico

Decocto a 5%: enxaguar os cabelos.


SUPERDOSAGEM

O uso em excesso pode causar vômitos, diarreia, contrações uterinas, insuficiência cardíaca e espasmos dos brônquios. A diminuição da frequência cardíaca pode terminar em colapso. Apesar da absorção intestinal do jaborandi ser lenta, em caso de superdosagem, podem ocorrer manifestações sistêmicas, caracterizadas por hemólise eritrocitária.

EFEITOS COLATERAIS

O uso interno pode causar vômitos, diarreia, insuficiência cardíaca.

 vendas@farmacam.com.br

 whatsapp (21) 98493-7033

 Facebook.com.br/farmacam

 Instagram.com.br/farmacam

Externamente pode causar irritação ocular.

PRECAUÇÕES

A pilocarpina é destruída com a ebulição. Deve ser utilizado na forma de infusão e não de decocto.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não deve ser usado por via oral, sem acompanhamento médico.

Especialmente contra indicado para pessoas cardíacas e de constituição fraca.