

## **LORATADINA**

Broncodilatador

### **Introdução**

É um derivado clorado de benzociclo-heptapiridinopireridina. Tem ação broncodilatadora suave. Não apresenta atividade anticolinérgica significativa.

### **Indicações**

**Loratadina** é indicada para o alívio dos sintomas associados com rinite alérgica tais como: coriza, espirros e prurido nasal, ardor e prurido ocular.

Os sinais e sintomas oculares e nasais são rapidamente aliviados após administração oral de **Loratadina**.

**Loratadina** também é indicada para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras afecções dermatológicas alérgicas.

### **Contra-indicações**

**Loratadina** é contra-indicado em pacientes que tenham demonstrado hipersensibilidade a este ativo.

### **Reações adversas**

**Loratadina** não apresenta propriedades sedativas clinicamente significativas quando utilizado na dose recomendada de 10 mg diárias.

As reações adversas reportadas comumente incluem fadiga, cefaléia, sonolência, boca seca, transtornos gastrintestinais, tais como náusea e gastrite e também sintomas alérgicos semelhantes à exantema.

Reações adversas como alopecia, anafilaxia e função hepática anormal foram reportadas raramente com a utilização de **Loratadina**.

### **Posologia**

A posologia recomendada para adultos e crianças acima de 12 anos é de 10mg uma vez, uma vez ao dia.

**Referências Bibliográficas:**


DEF – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas

Dicionário Terapêutico Guanabara – Andrejus Korokovas

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349

 [vendas@farmacam.com.br](mailto:vendas@farmacam.com.br)

 whatsapp (21) 98493-7033

 [Facebook.com.br/farmacam](https://www.facebook.com/farmacam)

 [Instagram.com.br/farmacam](https://www.instagram.com/farmacam)