

NITRENDIPINO
Anti-hipertensivo

Apresenta os ésteres metílico e etílico ligados ao anel diidropiridínico e o grupo nitro unido ao anel fenila. Sua estrutura é, portanto, muito semelhante à do nifedipino. Conseqüentemente, suas propriedades e seu mecanismo de ação também se assemelham.

Indicações

Tratamento de hipertensão essencial leve e moderada.

Doses

Via Oral - Adultos, 20 mg pela manhã, após o desjejum; se necessário, pode-se aumentar esta dose para 40 mg, divididos em duas tomadas, pela manhã e à noite; os idosos podem responder a doses de 5 a 10 mg.

Contra-Indicações

Crianças, gravidez, lactação e hipersensibilidade ao nitrendipino.

Efeitos Adversos

Cefaléia, rubor, edema de tornozelos, palpitações, tontura, alergia, poliúria e fadiga.

OBS.: A interrupção abrupta do tratamento pode causar o efeito rebote.

Interações Medicamentosas

Pode aumentar a concentração sérica de digoxina.

Beta-bloqueadores ou outros anti-hipertensivos podem potencializar seus efeitos anti-hipertensivos.

Referência bibliográficas

Korolkovas, Andrejus; Dicionário Terapêutico Guanabara, Guanabara koogan, 2008/2009.

