

## **OXAZEPAM** **(Portaria 344/98 – Lista B1)**

Oxazepam é um derivado benzodiazepínico depressor do sistema nervoso central, produzindo desde fraca sedação até hipnose e coma. Atua por um mecanismo de ativação gabaérgica, e facilita a ação inibitória do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA), que é o mediador da inibição, tanto no nível pré-sináptico como pós-sináptico, em todo o neuroeixo. Oxazepam apresenta boa absorção gastrointestinal, a ligação protéica é muito alta (97%). Via oral, o equilíbrio cinético plasmático é alcançado em poucos dias. A biotransformação é hepática; a excreção renal é rápida. A meia-vida de eliminação está entre 5 a 15 horas. É considerado um benzodiazepínico de meia-vida curta a intermediária e o acúmulo no organismo é mínimo.

**SINONIMOS:** Oksatsepaami, Oksazepamas, Oxazépam, Oxazepamum

**CAS:** 604-75-1

**PM:** 286,7

**INDICAÇÕES:** Distúrbios por ansiedade. Ansiedade associada com depressão mental. Sintomas de supressão alcoólica aguda. Insônia por ansiedade ou situações passageiras de estresse.

**DOSES E USOS:** Adulto: 10 a 30mg, via oral, 3 a 4 vezes ao dia.

Crianças: Não é recomendada o uso em crianças até 6 anos de idade, a posologia não está definida em crianças de até 12 anos.

**REAÇÕES ADVERSAS:** Reações mais freqüentes: ataxia, tontura, sonolência. Reações ocasionais: náuseas, vômito, visão turva, fraqueza geral, cefaléia, intolerância, confusão e/ou depressão mental.

**PRECAUÇÕES:** Evitar funções onde a falta de atenção aumenta o risco de acidentes (operar máquina, dirigir automóveis etc.). O consumo de bebidas alcoólicas, durante a terapia, pode resultar em aumento da depressão central. O uso prolongado dos benzodiazepínicos pode resultar em dependência psíquica ou física.

**INTERAÇÕES:** O uso de antiácidos pode retardar, mas não diminuir, a absorção; a administração prévia de oxazepam pode diminuir a dose necessária de um derivado da fentanila para induzir anestesia. O uso simultâneo com levodopa pode diminuir os efeitos terapêuticos desta droga. A escopolamina junto com oxazepam parenteral pode aumentar a incidência de sedação, alucinação e comportamento irracional.

**CONTRA-INDICAÇÕES:** Oxazepam está contra-indicada em pacientes que apresenta hipersensibilidade à droga.

### **REFERÊNCIAS**

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35<sup>a</sup>.Ed. PhP: Londres, 2007.

**P.R. Vade-mécum.** Disponível em: <http://www.prvademecum.com>

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam

