

## OXIBUTININA HCl

A Oxibutinina exerce seu efeito antiespasmódico direto sobre o músculo liso da bexiga retardando o desejo de urinar através da inibição da ação da acetilcolina nos pontos colinérgicos pós-ganglionares, não bloqueia os efeitos da acetilcolina nas uniões neuromusculares esqueléticas nem nos gânglios autonômicos. Tão pouco tem efeito sobre o músculo liso dos vasos sanguíneos. Tem atividade anti-histamínica moderada, certa atividade anestésica local e analgésica leve. Absorve-se com rapidez no trato gastrointestinal, metaboliza-se no fígado e elimina-se por via renal.

**SINÔNIMOS:** Oxybutynin, Oxybutinine, Oxybutinium

**CAS:** 5633-20-5

**PM:** 357,5

**INDICAÇÕES:** A Oxibutinina é indicada nos sintomas de distúrbios urológicos relacionados com a micção em pacientes com contrações não inibidas da bexiga neurogênica e nos caso de bexiga neurogênica reflexa.

**DOSES E USOS:** Adulto: 5mg, 2 a 3 vezes/dia. Dose máxima: 5mg, 4 vezes/dia. Criança maiores de 5 anos: 5mg, 2 a 3 vezes/dia, sem ultrapassar a dose de 15mg/dia.

**REAÇÕES ADVERSAS:** São de incidência mais freqüentes: constipação, sonolência, secura na boca, nariz e garganta, visão turva, micção difícil, náuseas vômitos e cansasos não habituais.

**PRECAUÇÕES:** Evitar o consumo de álcool ou de outros depressores do SNC, pois pode aumentar a fotossensibilidade ocular. Em pacientes com diarreia, deve-se excluir a possibilidade de obstrução intestinal antes de indicar a Oxibutinina. O uso prolongado de Oxibutinina pode diminuir ou inibir o fluxo de saliva, o que contribui para o desenvolvimento de cáries, doenças periodontal, candidíase oral.

**INTERAÇÕES:** O uso simultâneo com outros medicamentos antimuscarínicos potencializa este efeito, bem como aqueles que são depressores do SNC exarcerbam seu efeito sedativo ou da Oxibutinina.

**CONTRA-INDICAÇÕES:** A Oxibutinina é contra-indicada em pacientes com hipersensibilidade à droga. A relação risco/benefício deverá ser avaliada em estenose mitral, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, disfunção hepática ou renal, hipertensão, hipertireoidismo, colite ulcerosa grave e retenção urinária.

### REFERÊNCIAS

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35ª.Ed. PhP: Londres, 2007.

**P.R. Vade-mécum.** Disponível em: <http://www.prvademecum.com>



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam