

PIROXICAM

Piroxicam, derivado oxicam, é um antiinflamatório não-esteróide (AINE), inibidor da enzima ciclo oxigenase ocasionando inibição da síntese de prostaglandinas, que inibe a migração de polimorfonucleares e monócitos às zonas inflamadas, diminui a produção do fator reumatóide, tanto sistêmico como no líquido sinovial, em pacientes com artrite reumatóide seropositiva. Atua diminuindo a hipercontratibilidade do miométrio e é eficaz no tratamento da dismenorréia primária. Absorve-se bem por via oral ou retal. A vida plasmática está ao redor de 50 horas e as concentrações plasmáticas são mantidas com uma administração única ao dia; com doses de 10 a 20mg, alcança o máximo 3 a 5 horas após a administração. Por via IM, as concentrações plasmáticas são mais altas que por via oral. Metaboliza-se amplamente, 5% da dose diária são excretadas pela urina e fezes sem modificações.

SINÔNIMOS: Piroksikaami, Piroksikamas, Piroxicanum, Piroxikam

CAS: 36322-90-4

PM: 331,3

INDICAÇÕES: Piroxicam é indicado nos pacientes com inflamações não reumáticas (bursite, capsulite, sinovite, tendinite, tenosinovite); tratamento de artrite gotosa aguda; artrite reumatóide; condrocalcinose; espondilite anquilosante; inflamação não-reumática; osteoartrite; dismenorréia.

DOSES E USOS: Doenças reumáticas: vias oral ou retal, 20mg/dia ou 10mg, 2x/dia. Dismenorréia: via oral, 40mg quando começar os sintomas, somente no 1º dia; diminuir p/ 20mg/dia nos dias seguintes conforme a necessidade.

REAÇÕES ADVERSAS: Dor e desconforto abdominais, estomatite, constipação, diarreia, anorexia, indigestão; sangramento gastrintestinal, perfuração e úlcera; edema, principalmente do tornozelo; anemia aplástica; insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio; dermatite esfoliativa, eritema multiforme, fotossensibilidade.

PRECAUÇÕES: Piroxicam diminui os níveis de hemoglobina e hematócrito, estes devem ser determinados periodicamente. Piroxicam inibe a agregação plaquetária e prolonga o tempo de sangramento. Deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão ou outros quadros clínicos que predispõem à retenção de líquido, bem como em pacientes com insuficiência renal.

INTERAÇÕES: Piroxicam Pode potencializar os efeitos de anticoagulantes cumarínicos ou indandiônicos, heparina ou agentes trombolíticos. O ácido acetilsalicílico diminui sua biodisponibilidade.



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam

CONTRA-INDICAÇÕES: Piroxicam é contra indicado nos pacientes hipersensíveis aos oxicans; gravidez; lactação; menores de 18 anos; úlcera péptica; hemorragia gastrintestinal intensa; pacientes que desenvolveram asma, pólipos nasal, angioedema ou urticária induzidos por ácido acetilsalicílico ou outros antiinflamatórios não-esteróides.

REFERÊNCIAS

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35^a.Ed. PhP: Londres, 2007.

P.R. Vade-mécum. Disponível em: <http://www.prvademecum.com>