

PODOFILINA

A podofilina é extraída dos rizomas de *Podophyllum peltatum* (Berberidaceae) e contém podofilotoxinas e peltatinas.

Tem ação antimicótica, citotóxica e cáustica, é usada no tratamento de condilomas, epiteliomatoses, epitelomas, queratose, papilomas, língua nigra vilosa, em associação a tintura de benjoim é usada também para eliminar verrugas.

Uso Tópico:

Soluções alcoólicas, soluções aquosas, em tintura de benjoim, óleo mineral (suspensão), colódio elástico e eventualmente glicerina, usado de 5 a 30 %.

Condiloma acuminado: soluções de 10 a 25% durante 1 a 6 horas (máximo); repetindo cada 7 dias e até no máximo durante semanas.

Epiteliomatose superficial múltipla ou queratose pré epiteliomatosa: solução a 25%, 1 vez ao dia; durante vários dias.

Papiloma juvenil da laringe: 12,5% uma vez ao dia.

Pode ser formulada em óvulos vaginais, na concentração de 0,2 a 0,5, para condiloma acuminato.

Por ser altamente irritantes e lesivas para a pele, devem ser aplicadas pelo médico, em consultório, protegendo a pele em torno da lesão com vaselina sólida. O paciente deve retirar o produto após 4 horas da aplicação, com água e sabão. Como tem ação teratogênica, o seu uso esta contra indicado na gravidez. O seu uso tem sido associado a casos de abortamento, partos prematuros e morte fetal.

Referências:

Formulário Médico Farmacêutico.

