

## PRIMIDONA

A Primidona é um barbitúrico antiepiléptico que possui metabólitos ativos, fenobarbital e feniletilmalonamida com efeitos anticonvulsivantes seletivos principalmente no grande mal (epilepsia maior). Sua absorção digestiva é escassa mas difunde facilmente no plasma e tecidos. Sua ligação às proteínas é nula e sua meia-vida é prolongada, sofre biotransformação metabólica hepática e por oxidação transforma-se em fenobarbital.

**SINÔNIMOS:** Primidone, Hexanidum, Primaclone, Primidon, Primidona, Primidonum

**CAS:** 125-33-7

**PM:** 218,3

**INDICAÇÕES:** A Primidona é indicada no tratamento e controle da epilepsia e como adjuvante no controle do tremor essencial.

**DOSES E USOS:** Adulto: anticonvulsivo: 100 a 125mg/dia, via oral, na hora de dormir, durante os 3 primeiros dias, no 4º, 5º, 6º dia; 100 a 125mg 2 vezes/dia. No 7º, 8º, 9º dia, 100 a 125mg, 3 vezes/dia. No 10º dia passar para 250mg, 3 vezes/dia. Manutenção: 250mg, via oral, 3 ou 4 vezes/dia. Tremor essencial: via oral, 50 a 62,5mg/dia. Ajustar até o máximo de 750mg/dia. Criança: 50mg/dia, via oral. Na hora de dormir, durante os 3 primeiros dias; 4º, 5º, 6º dia, 50mg 2 vezes/dia. No 7º, 8º, 9º dia 100mg, 2 vezes/dia. Manutenção: 125 a 250mg, via oral, no 10º dia ou 10 a 25mg/kg/dia, fracionada.

**REAÇÕES ADVERSAS:** Reações mais freqüentes: ataxia, tontura, mas que tendem a desaparecer com a continuação do tratamento. Ocasionalmente pode ocorrer anorexia, sonolência e vômito.

**PRECAUÇÕES:** Pacientes submetidos à terapia anticonvulsiva prolongada pode necessitar de suplemento de ácido fólico e vitamina D para prevenir a osteomalácia. A suspensão da Primidona deve ser realizada com a redução gradual da dose a fim de evitar a ocorrência do estado epiléptico. Evitar bebidas alcoólicas ou outros depressores do SNC.

**INTERAÇÕES:** O uso concomitante de adrenocorticóides, cumarínicos e indandiônicos, contraceptivos orais contendo estrógenos e corticotrofinas: diminuição dos efeitos desses medicamentos, Com IMAO, incluindo furazolidona, procarbazina e selegina há prolongamento do efeito da primidona.

**CONTRA-INDICAÇÃO:** A Primidona é contra-indicada em pacientes com Porfíria aguda intermitente diversificada ou história progressiva, e hipersensibilidade à droga e ao fenobarbital.

### REFERÊNCIAS

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35ª.Ed. PhP: Londres, 2007.

**P.R. Vade-mécum.** Disponível em: <http://www.prvademecum.com>



vendas@farmacam.com.br



whatsapp (21) 98493-7033



Facebook.com.br/farmacam



Instagram.com.br/farmacam

**CONTRA-INDICAÇÃO:** A Primidona é contra-indicada em pacientes com Porfíria aguda intermitente diversificada ou história progressiva, e hipersensibilidade à droga e ao fenobarbital.

### **REFERÊNCIAS**

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**. 35ª.Ed. PhP: Londres, 2007.

**P.R. Vade-mécum**. Disponível em: <http://www.prvademecum.com>

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130

Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349



[vendas@farmacam.com.br](mailto:vendas@farmacam.com.br)



whatsapp (21) 98493-7033



[Facebook.com.br/farmacam](https://www.facebook.com/farmacam)



[Instagram.com.br/farmacam](https://www.instagram.com/farmacam)