

## **SECNIDAZOL**

*Antiparasitário*

**Nome Comum:** Secnidazol

**DL-50 (oral):** não foi encontrada em literatura consultada

### **Atividade**

**Secnidazol** é indicado para o tratamento de amebíase intestinal, amebíase hepática, giardíase e tricomoníase. Alguns estudos recentes tem demonstrado que o **Secnidazol** pode ser uma alternativa terapêutica, também, para as vaginites inespecíficas (geralmente causadas pela *Gardnerella vaginalis*).

### **Concentração usual**

Para o tratamento da tricomoníase: Adultos: dose única de 2g (4 cápsulas de 500mg ou 2 de 1000mg); a mesma dose para o cônjuge.

Amebíase intestinal e giardíase: Adultos: dose única de 2g. Crianças: dose única de 30mg/Kg ou 1 mL/Kg (máximo 2g). Amebíase hepática: Adultos: 500mg (1 cápsula), 3 vezes ao dia, por 5 a 7 dias. Crianças: 30mg/Kg/dia (máximo 2g) por 5 a 7 dias, ou seja, 1 mL/Kg/dia por 5 a 7 dias.

NOTA: Considerar a pureza do produto especificada no laudo (98,0 a 102,0%).

### **Reações adversas**

Distúrbios digestivos: náuseas, gastralgia, alteração do paladar, glossites e estomatites; erupções urticariformes; leucopenia moderada, reversível com a suspensão do tratamento; mais raramente: vertigens, fenômenos de incoordenação e ataxia, parestesias, polineurites sensitivomotoras.

### **Contra-indicações**

Hipersensibilidade aos derivados imidazólicos; suspeita de gravidez e nos três primeiros meses desta; aleitamento; antecedente de discrasia sanguínea; distúrbio neurológico.

### **Observação**

**Secnidazol** pode aumentar a ação da Warfarina (aumento do efeito anticoagulante).

**Secnidazol** pode sofrer ou provocar aumento das reações adversas com álcool e dissulfiram (risco de surto delirante, estado confusional). Não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento e até 4 dias após a descontinuação do mesmo.

### **Armazenamento**

Manter em recipiente hermeticamente fechado, distante da luz, umidade e calor.

### **Referência bibliográfica**

Merck Index 11<sup>th</sup> ,DEF 99/00, BPR-Guia do Paciente